

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Pozorně si prosím přečtěte následující informace!. V případě, že jim dostatečně nerozumíte, nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení. Zkontrolujte správnost všech údajů a pokud jste informacím porozuměl(a), vyjádřete souhlas s operací svým podpisem.

Vážená paní, vážený pane,

na základě předchozího vyšetření a konzultací Vám byla nabídnuta operace, která by Vaše obtíže měla odstranit nebo alespoň zmenšit, Účelem tohoto souhlasu je poskytnuta Vám dodatečné informace, které umožní Vaše kvalifikované rozhodnutí, zda tuto operaci podstoupíte či nikoliv. Jedná se o následující výkon:

operace deformit nohou - vbočený palec, deformity prstů apod.

Deformity nohou vznikají zpravidla delší dobu za působení mnoha nepříznivých faktorů – např nevhodná obuv, vrozené dispozice, úrazy, sportovní a profesní přetížení nohou apod. Operační zákrok je navrhován dle konkrétního nálezu a konkrétních potíží. (v současné době je popsáno přes 200 operačních postupů modifikovaných pro různé typy deformit). U nás používané metody jsou ty, se kterými máme nejlepší zkušenosti a jsou pacientky velmi dobře hodnoceny. U operací deformit nohou je plánování vždy zaměřené na co nejlepší výsledek z dlouhodobého pohledu.

Nejčastější deformity u nás řešené:

- vbočený palec (hallux valgus)
- artróza základního (MTP) kloubu palce
- „kladívkové“ a „drápkovité“ prsty
- bolestivá příčně plochá noha
- bolestivé výrůstky a otlaky nohou

Alternativou operační léčby je konzervativní postup zahrnující rehabilitace, lokální antirevmatika, ortopedické vložky, speciální ortopedická obuv... nikdy však neřeší příčinu a podstatu problému.

Jaký je operační postup?

Zákrok se v našem zařízení provádí zpravidla formou ambulantního výkonu. Zákrok se provádí v celkové anestezii. Před celkovou anestezí musí pacient zůstat nejméně 6 hodin lačný, nesmí tedy nic jíst ani pít. Jak užít dlouhodobě užívané léky pacientovi sdělí jeho ošetřující lékař. Kůže operované nohy a její bezprostřední okolí se musí oholit, na operačním sále se potom tato oblast natírá dezinfekčním roztokem. Je třeba předem upozornit na případnou alergii na tyto přípravky. Vlastní operace je prováděna na operačním sále. Výkony cílené na korekci osové deformity – tzv. osteotomie – spočívají v protnutí kosti, korekci a následně fixace šroubky, dlahami a případně jinými implantáty. Tyto se zpravidla již následně neodstraňují.

Při operaci artrozy základního kloubu palce se nejčastěji používá metoda znehybnění (srůstu) postiženého kloubu. Při operaci jsou sneseny postižené a zdevastované původní klubní plochy a kosti se k sobě spojí speciálními implantáty popř šrouby.

Další možností v této indikaci je tzv. resekční artroplastika – kdy se odstraní poškozené kloubní plochy a výrůstky a ponechá se bez fixace. Zoravidla dojde ke zkrácení palce a částečné ztrátě jeho opěrné funkce.

Při poklesu příčné klenby volíme operační metodu osteotomie pod hlavičkami zánártních kůstek s korekcí a fixací kovovými drobnými implantáty.

U revmatických a těžkých deformitách se volí pouze vynětí deformovaných hlaviček zánártních kůstek.

Tyto výkony nevyžadují speciální předoperační přípravu, pouze podání antibiotik dle ordinace indikujícího lékaře a povahy zákroky.

Jaké jsou možné komplikace a rizika?

Jako každý operační zákrok jsou i tyto operace spojeny s rizikem komplikací.

Komplikace lokální:

krvácení, poranění nervů, infekce operační rány, nadměrný otok v operované lokalitě

Komplikace celkové:

flebotromboza hlubokých žil s rizikem embolie, kardiovaskulární komplikace

Pooperační průběh

Po celkové anestezii se může objevit pocit na zvracení, ale většinou jen krátce a stav se sám upraví, nebo lze případně podat příslušný lék. Pooperační bolest je přirozená, bude tlumena příslušnými léky. Následující jeden až dva dny po operaci se může objevit lehce zvýšená teplota, která neznámá komplikaci, jedná se o přirozený jev.

Následná péče po operaci

Je dána především povahou zákroku. Druhý až třetí pooperační den se zpravila rána převazuje. Povahou zákroku se řídí další odlehčení s francouzskými holemi, intenzita rehabilitace atd. Zde je nutné konkrétní doporučení operátora a dle nálezu navržen optimální postup.

Omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti:

Přechodné bolesti a otoky nohy.. Cca 2-6 týdnů po operaci je nutné odlehčení operované DK chůzí o berlích. Délka pracovní neschopnosti závisí na charakteru vykonávaného zaměstnání, u sedavého zaměstnání se jedná o cca 4-6 týdnů, u zaměstnání fyzicky náročnějších to může být i 4-6 měsíců.

PROSÍM PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Prohlašuji, že mi byl náležitě a srozumitelně objasněn důvod operace, způsob jejího provedení včetně umístění řezů, rozsah vlastního chirurgického zákroku a předpokládaný vzhled budoucích jizev. Poučení jsme pochopil(a) a jsem si vědom(a) možných komplikací. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

.....
datum

.....
podpis pacienta

Potvrzuji, že jsem pacientovi, případně jednomu z rodičů nebo zákonnému zástupci, vysvětlil povahu a způsob provedení operace, způsob znecitlivění a pravděpodobný pooperační průběh, včetně rizika možných komplikací a včetně případných pooperačních omezení, a to tak, aby tyto informace byly dle mého názoru této osobě dostatečně srozumitelné.

.....
datum

.....
Razítko a podpis lékaře