

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Pozorně si prosím přečtěte následující informace!. V případě, že jim dostatečně nerozumíte, nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení. Zkontrolujte správnost všech údajů a pokud jste informacím porozuměl(a), vyjádřete souhlas s operací svým podpisem.

Vážená paní, vážený pane,

na základě předchozího vyšetření a konzultací Vám byla nabídnuta operace, která by Vaše obtíže měla odstranit nebo alespoň zmenšit, Účelem tohoto souhlasu je poskytnuta Vám dodatečné informace, které umožní Vaše kvalifikované rozhodnutí, zda tuto operaci podstoupíte či nikoliv. Jedná se o následující výkon:

Artroplastika sedlového (I.CMC) kloubu palce ruky

Artroplastika sedlového (I.CMC) kloubu palce ruky

je metoda, která se používá k odstranění bolesti způsobené artrózou skloubení mezi tzv. kostí trapézovou a první záprstní kosti na ruce. V našem zařízení se provádí zpravidla formou ambulantního výkonu. Samotná operace je prováděna v celkové anestezii. O způsobu a podrobnostech anestezie budete ještě mluvit s anesteziologem bezprostředně před operací samotnou. Před celkovou anestezií musí pacient zůstat nejméně 6 hodin lačný, nesmí tedy nic jíst ani pít. Jak užít dlouhodobě užívané léky pacientovi sdělí jeho ošetřující lékař. Kůži operovaného kloubu a jeho okolí se na operačním sále natírá dezinfekčním roztokem. Je třeba předem upozornit na případnou alergii na tyto přípravky.



Cílem operace (je prováděna pod clonou antibiotika) je odstranění artrózou poškozené a deformované trapézové kosti v zápěstí, odstranění výrůstků na první záprstní kosti a stabilizace kloubu pomocí šlachového štěpu. Následně se provede rekonstrukce měkkých tkání a sutura (sešití) kůže. Zpravidla přikládáme sádrovou dlahu na zevní hranu zápěstí a palec.

Pooperační průběh

Po celkové anestezii se může objevit pocit na zvracení, ale většinou jen krátce a stav se sám upraví, nebo lze případně podat příslušný lék. Pooperační bolest je přirozená, bude tlumena příslušnými léky. Následující jeden až dva dny po operaci se může objevit lehce zvýšená teplota, která neznamená komplikaci, jedná se o přirozený jev.

Možné komplikace a rizika

- lokální krvácení, infekce operační rány, otok zápěstí a ruky
- pohmoždění/poražení nervově-cévních struktur, zvláště drobných senzitivních nervů při jejichž pohmoždění může přechodně dojít ke zhoršení až výpadku citlivosti palce, úprava je pak v řádu týdnů až měsíců-

Omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti:

Přechodná bolest a otok palce a zápěstí, přechodné omezení rozsahu hybnosti. Délka pracovní neschopnosti závisí na charakteru vykonávaného zaměstnání, zpravidla se jedná o cca 6-8 týdnů, u zaměstnání fyzicky náročnějších to může být i 3-6 měsíců. Jedná se o výkon, který ze své podstaty plně nenahrazuje „zdravý kloub“ a nemusí vždy plně obnovit 100% úchopovou schopnost a sílu ruky.

PROSÍM PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ !

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Prohlašuji, že mi byl náležitě a srozumitelně objasněn důvod operace, způsob jejího provedení včetně umístění řezů, rozsah vlastního chirurgického zákroku a předpokládaný vzhled budoucích jizev. Poučení jsme pochopil(a) a jsem si vědom(a) možných komplikací. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

.....
datum

.....
podpis pacienta

Potvrzuji, že jsem pacientovi, případně jednomu z rodičů nebo zákonnému zástupci, vysvětlil povahu a způsob provedení operace, způsob znecitlivění a pravděpodobný pooperační průběh, včetně rizika možných komplikací a včetně případných pooperačních omezení, a to tak, aby tyto informace byly dle mého názoru této osobě dostatečně srozumitelné.

.....
datum

.....
Razítko a podpis lékaře